

# Salmo-Stop *Extra Strong*

## SALMONELLEN, E-COLI UND BAKTERIELLE INFektIONEN

### Indication:

Salmonella (paratyphoid), E-Coli and bacterial infections.

### Symptome:

Durchfall (grüne Diarrhoe und bei einigen Vögeln mit Erbrechen), langsames Trocknen des Halses, Infektionsarthritis (Hinken oder „gefallener“ Flügel), Unterhautabszess (gewöhnlich unter den Augen, mit der Form von kleinen, gelben und harten Eiterbeutelchen), Fruchtlosigkeit, plötzlicher Tod.

### PULVER

#### Dosierung

**Vorbeugend:** 1 Messlöffel (=5g) pro 2 Liter Wasser) im Laufe von 1 oder 2 Tagen, jede 2 Wochen, empfohlen wird Beginn nach dem Wettbewerntag.

**Heilung:** 1 Messlöffel (=5g) pro 2 Liter Wasser, im Laufe von 5-7 aufeinanderfolgenden Tagen.

Diese Arznei kann bei Notwendigkeit nach ein paar Tagen wiederholt werden. Vor Gebrauch gut rühren! Salmo Stop ist wasserlösliches Pulver, das auch zusammen mit der Nahrung gegeben werden soll. Messlöffel 1+5g eingefügt



### Inhalt:

Furaltadone HCl 12,5%, Chlortetracycline HCl 12,5%, Chloramphenicol 8%, Wirkstoffe genügend für 100 g

### TABLETTEN

#### Dosierung

**Vorbeugend:** 1 Tablette pro Taube (400-500g Körpergewicht) im Laufe von 1-2 aufeinanderfolgenden Tagen.

**Heilung:** 1 Tablette pro Taube (400-500g Körpergewicht) für 3-5 aufeinanderfolgende Tage oder nach Vorschrift eines Veterinärarztes.

### Wirkstoffe

Chlortetracycline HCl: 78 mg/g ; Furaltadone HCl 80 mg/g ; Chloramphenicol 50 mg/g